

Les CAMOMILLES sensu lato (genre *Matricaria*)

Plantes à capitule à fleurs jaunâtres, brunâtres, verdâtres ou rougeâtres.

Les CAMOMILLES sensu lato (genres *Anthemis*, *Chamaemelum*, *Matricaria*, *Tripleurospermum*)

Fleurs, au moins certaines, d'une autre couleur que jaune, fleurs ligulées et tubulées.

1	Plantes à capitule à fleurs jaunâtres, brunâtres, verdâtres ou rougeâtres. Capitules de 5-10 mm de diam. Pas de fleurs ligulées. <i>5-30 cm. — Juin-nov. — Thér. — Bord des chemins, cours de ferme, endroits piétinés et rudéralisés. — C-AC.</i>	<i>Matricaria discoidea</i> Matricaire suave
	Fleurs, au moins certaines, d'une autre couleur que jaune, fleurs ligulées et tubulées.	2
2	Bractées de l'involucre de longueurs différentes, les ext. plus courtes. Réceptacle floral à paillettes linéaires à lancéolées entre les fleurs tubulées.	3
	Bractées de l'involucre de longueurs égales. Réceptacle floral sans paillettes entre les fleurs tubulées.	4
3	Plantes de plus de 30 cm de haut, des cultures et des sites rudéralisés, à odeur désagréable, glabres (<i>Anthemis cotula</i>) ou inodores, pubescentes (<i>Anthemis arvensis</i>).	Genre <i>Anthemis</i> Voir 5
	Plantes de moins de 30 cm de haut, des jardins, pubescentes, à odeur agréable (camomille). <i>15-30 cm. — Juill.-sept. — Hémicrypt. — Moissons, pelouses, bord des étangs, surtout sur des sols sablonneux. — Mar. mér., Tert. par. : RR ; ailleurs : parfois subsponané. Cultivé comme plante médicinale dans les jardins et parfois en grand.</i> <i>OBS. — Les plantes cultivées à usage médicinal appartiennent souvent à un cultivar dit « à fleurs doubles », dont les capitules sont formés de fleurs toutes ligulées.</i>	<i>Chamaemelum nobile</i> (anc. <i>Anthemis nobilis</i>) Camomille romaine
4	Plantes glabres, très odorantes. Fleurs ligulées blanches réfléchies en fin de floraison. Réceptacle du capitule (15-25 mm) creux. <i>15-50 cm. — Mai-août. — Thér. — Moissons, cultures, sites rudéralisés, terrains vagues, cendrées. — C-AR, sauf Ard. et Eifel centr. : R. Devenu subcosmopolite (surtout régions tempérées). Aire d'indigénat incertaine.</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> (anc. <i>Matricaria recutita</i>) Matricaire camomille
	Plantes gén. glabres, inodores, gén. teintées de pourpre. Réceptacle du capitule plein.	Genre <i>Tripleurospermum</i> Voir 6
5	Plantes glabres ou à quelques rares poils, à forte odeur désagréable. Fleurs ligulées gén. stériles. Paillettes du réceptacle linéaires. <i>20-50(-80) cm. — Juin-nov. — Thér. — Moissons, cultures, friches, bord des chemins. — Mar. sept. (polders), Pic., Tert. par. : R ; Camp., Brab., Mosan (surtout occ.) : R-RR ; ailleurs : RR ou nul.</i>	<i>Anthemis cotula</i> Anthémis cotule
	Plantes poilues, à odeur faible ou sans odeur. Fleurs ligulées femelles. Paillettes du réceptacle lancéolées. <i>15-45 cm. — Juin-nov. — Thér. — Moissons, cultures, friches, bord des chemins. — Mosan, Ard., Lorr., Eifel centr. : AC ; Camp., Pic., Brab., Champ., Tert. par. : AR-R ; ailleurs : R-RR.</i>	<i>Anthemis arvensis</i> Anthémis des champs
6	Moins de 20 fleurs ligulées par capitule. Bractées de l'involucre de moins de 1,5 mm de large. Plantes des sites rudéralisés. <i>15-60 cm. — Juin-nov. — Thér. — Terrains vagues, cultures, bord des chemins. — C-AC.</i>	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Fausse-Matricaire perforée

<p>De 20 à 35 fleurs ligulées par capitule. Bractées de l'involucre de moins de 1,5 à 5 mm de large. Plantes des digues et du Littoral.</p> <p><i>10-40 cm. — Juill.-nov. — Hémicrypt. ou Cham. herb. — Dignes maritimes, laisses de marées, falaises littorales, bord des chemins ; plante halophile. — Mar. : AC-AR.</i></p>	<p><i>Tripleurospermum maritimum</i> (anc. <i>Matricaria maritima</i>) Fausse-Matricaire maritime</p>
<p>Francis MAUHIN — CNB — 2023</p>	