

HYPOCHAERIS

1	Tige très velue. Feuilles à taches violettes. Soies de l'aigrette plumeuses et disposées sur un rang. 20-60 cm. — Juin-juill. — Prairies sèches, landes herbeuses. — Ard. or. (Oesling et Haute Ard.), Eifel centr. : RR.	<i>H. maculata</i> (Porcelle tachée)
	Tige glabre ou légèrement pubescente. Feuilles gén. non tachées de violet. Soies de l'aigrette de deux types, les ext. denticulées, les int. plumeuses et disposées sur deux verticilles.	2
2	Feuilles souples et glabres, parfois ciliées. Capitules de 1,5-2,5 cm de diam., fleurs ligulées dépassant peu l'involucre. Akènes du centre du capitule avec bec, les autres sans. 7-30 cm. — Juin-sept. — Landes, pelouses, friches, champs, dunes, souvent sur des sols sablonneux. — Mar. (surtout mér.) : R ; Fl., Camp., Brab., Lorr. : RR ou disparu. En voie de raréfaction dans le territoire de la Flore.	<i>H. glabra</i> (Porcelle glabre)
	Feuilles gén. coriaces et velues. Capitules de 2,5-4 cm de diam., fleurs ligulées dépassant nettement l'involucre. Tous les akènes avec bec. 15-60 cm. — Juin-sept. — Prairies, pelouses, dunes, friches, surtout sur des sols siliceux. — C-AC, sauf Champ. : AR.	<i>H. radicata</i> (Porcelle enracinée)
<i>Francis MAUHIN — CNB — 2021</i>		