

1	Plantes à capitule à fleurs jaunâtres, brunâtres, verdâtres ou rougeâtres. Capitules de 5-10 mm de diam. Pas de fleurs ligulées. 5-30 cm. — Juin-nov. — Thér. — Bord des chemins, cours de ferme, endroits piétinés et rudéralisés. — C-AC.	Matricaria discoidea Matricaire discoïde
	Fleurs, au moins certaines, d'une autre couleur que jaune, fleurs ligulées et tubulées.	2
2	Bractées de l'involucre de longueurs différentes, les ext. plus courtes. Réceptacle floral à paillettes linéaires à lancéolées entre les fleurs tubulées.	3
	Bractées de l'involucre de longueurs égales. Réceptacle floral sans paillettes entre les fleurs tubulées.	4
3	Plantes de plus de 30 cm de haut, des cultures et des sites rudéralisés, à odeur désagréable, glabres (<i>Anthemis cotula</i>) ou inodores, pubescentes (<i>Anthemis arvensis</i>).	Genre Anthemis Voir 5
	Plantes de moins de 30 cm de haut, des jardins, pubescentes, à odeur agréable (camomille). 15-30 cm. — Juill.-sept. — Hémicrypt. — Moissons, pelouses, bord des étangs, surtout sur des sols sablonneux. — Mar. mér., Tert. par. : RR; ailleurs : parfois subspontané. Cultivé comme plante médicinale dans les jardins et parfois en grand. OBS. — Les plantes cultivées à usage médicinal appartiennent souvent à un cultivar dit « à fleurs doubles », dont les capitules sont formés de fleurs toutes ligulées.	Chamaemelum nobile (anc. <i>Anthemis nobilis</i>) Camomille romaine
4	Plantes glabres, très odorantes. Fleurs ligulées blanches réfléchies en fin de floraison. Réceptacle du capitule (15-25 mm) creux. 15-50 cm. — Mai-août. — Thér. — Moissons, cultures, sites rudéralisés, terrains vagues, cendrées. — C-AR, sauf Ard. et Eifel centr. : R. Devenu subcosmopolite (surtout régions tempérées). Aire d'indigénat incertaine.	Matricaria chamomilla (anc. <i>Matricaria recutita</i>) Camomille sauvage
	Plantes gén. glabres, inodores, gén. teintées de pourpre. Réceptacle du capitule plein.	Genre Tripleurospermum Voir 6
5	Plantes glabres ou à quelques rares poils, à forte odeur désagréable. Fleurs ligulées gén. stériles. Paillettes du réceptacle linéaires. 20-50(-80) cm. — Juin-nov. — Thér. — Moissons, cultures, friches, bord des chemins. — Mar. sept. (polders), Pic., Tert. par. : R; Camp., Brab., Mosan (surtout occ.) : R-RR; ailleurs : RR ou nul.	Anthemis cotula Camomille puante
	Plantes poilues, à odeur faible ou sans odeur. Fleurs ligulées femelles. Paillettes du réceptacle lancéolées. 15-45 cm. — Juin-nov. — Thér. — Moissons, cultures, friches, bord des chemins. — Mosan, Ard., Lorr., Eifel centr. : AC; Camp., Pic., Brab., Champ., Tert. par. : AR-R; ailleurs : R-RR.	Anthemis arvensis Camomille des champs
6	Moins de 20 fleurs ligulées par capitule. Bractées de l'involucre de moins de 1,5 mm de large. Plantes des sites rudéralisés. 15-60 cm. — Juin-nov. — Thér. — Terrains vagues, cultures, bord des chemins. — C-AC.	Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore
	De 20 à 35 fleurs ligulées par capitule. Bractées de l'involucre de moins de 1,5 à 5 mm de large. Plantes des digues et du Littoral. 10-40 cm. — Juill.-nov. — Hémicrypt. ou Cham. herb. — Dignes maritimes, laisses de marées, falaises littorales, bord des chemins; plante halophile. — Mar. : AC-AR.	Tripleurospermum maritimum (anc. <i>Matricaria maritima</i>) Matricaire maritime