

## CREPIS

1	Akènes, au moins ceux du centre, prolongés en un bec long et filiforme.	2
	Akènes sans bec, rétrécis au sommet.	4
2	Ligule des fleurs jaune sur les deux faces. Involucre et pédoncule hérissés de longs poils, raides et jaunâtres, non glanduleux. <i>15-45 cm. — Juill.-août. — Abords des villages, bord des chemins, cultures (surtout de luzerne et de trèfle). — Lorr., Champ., Tert. par. : R ; ailleurs : RR, adventice (ou parfois naturalisé localement) ou nul.</i>	<i>C. setosa</i> (Barkhausie hérissée)
	Ligule des fleurs striée de pourpre à la face inf. Involucre et pédoncule pubescents ou glanduleux, mais jamais hérissés de longs poils jaunâtres.	3
3	Plantes à odeur tenace d'iode (odeur un peu safranée), gén. sur sols calcarifères. Capitules penchés avant la floraison, style jaune. Akènes de deux types dans un même capitule : ceux du centre à bec très long, ceux de la périphérie à bec très court. <i>15-30 cm. — Juin-sept. — Friches, déblais de carrières, terrils, ballast des voies ferrées, surtout sur des sols calcarifères. — Lorr., Champ., Tert. par. : AR ; Pic. mér., Mosan : R ; ailleurs : RR ou nul.</i>	<i>C. foetida</i> (Barkhausie fétide)
	Plantes à odeur faible voire inodores. Capitules dressés avant la floraison, style brun foncé à noirâtre. Akènes d'un seul type dans un même capitule : tous à bec long. <i>20-70 cm. — Mai-août. — Friches, bord des chemins, prairies artificielles, dunes, ballast des voies ferrées. — Boul., Lorr. (sauf N), Champ. : C-AC ; Mar. : AC-AR ; Pic. (surtout occ.), Brab. (surtout occ.), Mosan, Tert. par. : AR ; ailleurs : R-RR ou nul.</i>	<i>C. vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Crépis à feuilles de pissenlit)
4	Tige pubescente, glanduleuse et visqueuse dans la partie inf. Bractées de l'involucre glabres. <i>20-70 cm. — Juin-juill. — Friches, vignobles, bord des chemins, surtout sur des sols calcaires. — Lorr., Champ., Tert. par. : R ; Pic. mér. : RR, d'indigénat douteux ; ailleurs : parfois adventice.</i>	<i>C. pulchra</i> (Crépis élégant)
	Tige jamais glanduleuse dans la partie inf. Bractées de l'involucre à pilosité variable.	5
5	Plantes des milieux très humides (marais, prairies, forêts), vivaces, à rhizomes. Aigrettes de soies blanc roussâtre, légèrement raides et cassantes. <i>30-90 cm. — Mai-juill. — Marécages le long des ruisseaux et des rivières, prairies à hautes herbes, forêts très humides. — Ard. : AC ; Eifel centr. : AR ; Camp. (surtout sept.), Brab. centr. et or., Lorr. sept. et or. : R ; Fl., Mosan : RR.</i>	<i>C. paludosa</i> (Crépis des marais)
	Plantes annuelles ou bisannuelles des sites rudéralisés, plutôt sur sols secs et sableux. Aigrettes de soies blanc pur, molles, flexibles.	6
6	Feuilles caulinaires à bord enroulé. Akènes brun sombre, à 10 côtes longitudinales, saillantes et épineuses. <i>10-60 cm. — Mai-oct. — Cultures et pelouses sur des sols sableux, dunes, vieux murs. — Camp. (surtout sept. et or.), Champ., Tert. par. : R-RR ; ailleurs : RR ou nul ; indigénat douteux.</i>	<i>C. tectorum</i> (Crépis des toits)
	Feuilles caulinaires à bord plan. Akènes jaunâtres, lisses ou presque.	7

	Involucre de moins de 8 mm de long. Akènes de moins de 5 mm de long, à 10 côtes longitudinales. 5-60(-80) cm. — Juin-oct. — Prairies, friches, bord des chemins, cultures négligées, dunes. — C-AC.	<i>C. capillaris</i> (Crépis à tige capillaire)
7	Involucre de plus de 10 mm de long. Akènes de plus de 5 mm de long, à 13-20 côtes longitudinales. 30-120 cm. — Juin-août(-oct.). — Prairies à faucher, bord des chemins. — C-AC, sauf Mar., Pic. : AR, Fl., Camp. or. et Ard. : R.	<i>C. biennis</i> (Crépis des prés)
<i>Francis MAUHIN — CNB — 2021</i>		