

## HIERACIUM

1	Plantes avec, lors de la floraison, des feuilles basilaires, parfois peu nombreuses ; feuilles caulinaires absentes ou peu nombreuses (moins de 8).	2
	Plantes sans feuilles basilaires lors de la floraison, plus de 8 feuilles caulinaires.	6
2	Feuilles caulinaires embrassant nettement la tige, poils glanduleux nettement présents sur les feuilles, visibles à l'œil nu. <i>Vieux murs, sites rudéralisés. RR. Introduit.</i>	<i>H. amplexicaule</i>
	Feuilles caulinaires non embrassantes, sans poils glanduleux visibles à l'œil nu.	3
3	Tige à moins de 2 feuilles (rar. 2).	4
	Tige à plus de 2 feuilles.	5
4	Feuilles vert franc, non tachées, bord des feuilles muni de poils fins, souples. <i>Sites rudéralisés, rochers, lisières et coupes forestières. AC.</i>	<i>H. murorum</i>
	Feuilles glauquescentes, plutôt minces, gén. tachées de noir à la face sup., bord des feuilles muni de petites glandes gén. assez rares et minuscules et de poils fins, mous, entremêlés de soies raides. <i>Rochers, éboulis, vieux murs, sites rudéralisés, lisières forestières, gén. sur sols calcarifères. RR.</i>	<i>H. glaucinum</i>
5	Feuilles vert glauque, gén. tachées de couleur sombre, lie de vin, à la face sup., gén. glabres ou presque glabres à la face sup. Inflorescence lâche. <i>Sites rudéralisés, lisières et coupes forestières. R.</i>	<i>H. maculatum</i>
	Feuilles vert pâle ou vert foncé, non tachées à la face sup., gén. velues à la face sup. Inflorescence contractée. <i>Sites rudéralisés, Lisières et coupes forestières. AC.</i>	<i>H. lachenalii</i>
6	Bractées externes de l'involucre très étalées ou réfléchies. <i>Lisières, coupes forestières, landes, pelouses, dunes, sur sols acides. C.</i>	<i>H. umbellatum</i>
	Bractées externes de l'involucre non réfléchies, faiblement écartées ou appliquées contre les internes.	7
7	De 8 à 30 feuilles caulinaires, avec, latéralement, 2-5 dents saillantes. Bractées de l'involucre gén. aiguës, non ou peu glanduleuses, à poils simples, rares ou nuls. <i>Lisières, coupes forestières, landes, pelouses, sites rudéralisés. AC.</i>	<i>H. laevigatum</i>
	De 10 à 50 feuilles caulinaires, à dents non saillantes. Bractées de l'involucre obtuses, à poils simples et glanduleux. <i>Lisières, coupes forestières, sites rudéralisés, landes, sur sols acides. AC.</i>	<i>H. sabaudum</i>