

LEONTODON

1	<p>Plantes sur sols calcarifères. Tige à poils raides blanchâtres, pubescente. Fleurs ligulées externes orangées à la face inf. Tous les akènes surmontés d'une aigrette de soies.</p> <p><i>15-40 cm. — Juin-oct. — Mellifère. — Prairies sèches, pelouses, sur sols calcarifères. — AC.</i></p> <p><i>Deux sous-espèces dans le territoire de la Flore, gén. bien distinctes, la seconde à distribution et écologie très limitées, l'une et l'autre variables en ce qui concerne l'indument (revêtement de poils ou d'écaillés).</i></p>	<p><i>L. hispidus</i> (Dent de lion à poils raides)</p>
	<p>Plantes sur sols acides. Tige à poils épars, presque glabre. Fleurs ligulées externes gris brun à la face inf. Akènes externes sans aigrette de soies.</p> <p>Akènes externes sans aigrette de soies.</p> <p><i>5-25 cm. — Juin-oct. — Dunes, prairies, pelouses, friches, landes herbeuses, surtout sur des sols filtrants. — Mar. : C ; Camp. : AC-AR ; ailleurs : AR-R, sauf Ard. et Eifel centr. : RR.</i></p>	<p><i>L. saxatilis</i> (Thrincie)</p>
Francis MAUHIN — CNB — 2021		