

PILOSELLA

1	Plantes sans stolons. Feuilles basilaires à poils étalés épars ou peu abondants à la face inf. Inflorescence gén. lâche.	<i>P. piloselloides</i> subsp. <i>piloselloides</i>
	Plante avec stolons.	2
2	Tige nue à un seul capitule. Stolons allongés, de 8-30 cm de long, grêles, à feuilles espacées, nettement plus longues que les feuilles basilaires. Bractées de l'involucre de moins de 11 mm de long, à poils courts, de 1-2 mm de long. 20-80 cm. — Mai-juill. — Vieux murs, bord des chemins, ballast des voies ferrées, friches, terrils, déblais de carrières. — Lorr. : R ; Camp. or., Brab., Mosan, Ard. or. (Oesling) : RR. Naturalisé et en voie d'extension dans le territoire de la Flore.	<i>P. officinarum</i>
	Tige feuillée, à au moins 2 capitules.	3
3	Fleurs ligulées pourprées ou orange foncé sur les deux faces. 20-80 cm. — Juin-août. — Bord des chemins, talus, pelouses rudéralisées, terrains vagues, abords des habitations. — Cultivé pour l'ornement dans les jardins. — R-RR, subspontané ou naturalisé.	<i>P. auriantiaca</i>
	Fleurs ligulées jaunes, les extérieures parfois striées de rouge à la face inf.	4
4	Face inf. des feuilles à poils moyennement abondants à très denses. Plusieurs capitules (2-6). Bractées de l'involucre noirâtres. 10-30(-50) cm. — Mai-juin(-sept.). — Pelouses sèches rocailleuses ou sableuses, friches. — Mosan, Ard. mér., Lorr. occ. (Argonne) : RR.	<i>P. flagellaris</i>
	Face inf. des feuilles glabre ou munie de poils épars, peu abondants.	5
5	Tige de moins de 30 cm de haut. Feuilles glabres ou à poils épars (ni glanduleux ni étoilés) ; feuilles basilaires de moins de 7 cm de long. Max. 3 capitules par tige. 5-20(-30) cm. — Mai-août. — Pelouses, prairies, landes, clairières, surtout sur des sols acides. — Ard. : AR-R ; Mosan : R ; ailleurs : RR ou nul. En régression dans le territoire de la Flore.	<i>P. lactucella</i>
	Tige de plus de 30 cm de haut. Feuilles gén. à poils étoilés à la face inf. ; feuilles basilaires de plus de 9 cm de long. De 3 à 80 capitules par tige.	6
6	Feuilles d'un vert franc, gén. denticulées, à poils étoilés à la face inf. Tige hérissée de poils mous. Styles livides ou noirâtres. 30-80 cm. — Mai-sept. — Ballast des voies ferrées, clairières, talus, coupes forestières. — Camp., Pic., Brab., Mosan, Ard., Lorr., Tert. par. : RR ; indigénat douteux. En voie d'extension dans le territoire de la Flore.	<i>P. caespitosa</i>
	Feuilles glauquescentes, non denticulées, les basilaires gén. sans poils étoilés à la face inf. ou à poils rares et concentrés sur la nervure dorsale. Tige hérissée de poils raides. Styles jaunes. 30-80 cm. — Mai-août. — Ballast des voies ferrées, coupes forestières, clairières, talus, terrils, déblais de carrières, vieux murs. — Camp. (surtout or.), Mosan (surtout or.), Lorr. : AR ; Brab. (surtout occ. et or.) : R ; Fl., Pic. sept., Ard., Champ., Tert. par. : RR. En voie d'extension dans le territoire de la Flore.	<i>P. piloselloides</i> subsp. <i>bauhinii</i>